



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 4 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 4 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 21.8 - 28.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 25°C, tổng lượng mưa là 38.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 156mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 12.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 31.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23/4 tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng; từ khoảng ngày 24-26/4 nắng nóng có khả năng mở rộng ra hầu khắp các khu Trung Trung Bộ; khoảng ba, bốn ngày cuối tháng 4/2022 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.8	20.5	22.1	194.9
Trong tuần	28.3	21.8	25.0	38.9
Tuần tới	35.0-37.0	21.0-24.0	28-30.5	5.0-10.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 4 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Trỗ - ngâm sữa - chắc xanh	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 21.8-28.3°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 38.9mm. Có thể nhận thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần khá thấp không bảo đảm nhu cầu của cây lúa trong các giai đoạn này. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây lúa. Ở những nơi điều kiện thủy lợi cho phép, cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 5cm để bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng khỏe mạnh. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa

			trong tuần cần chú ý: bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm...
Cây ngô	Đông xuân	Trỗ cờ - thâm râu - thu hoạch	Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa của khu vực trong tuần có xu thế giảm mạnh so với tuần trước; đây là điều kiện tương đối phù hợp cho cây ngô trong giai đoạn trỗ cờ cũng như công tác thu hoạch các diện tích ngô đã già. Người dân cần tranh thủ thời tiết để thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm, đồng thời tích cực chăm sóc giúp các diện tích ngô còn lại phát triển khỏe mạnh tạo tiền đề cho năng suất cao. Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi các đối tượng gây hại: sâu xám, sâu đục thân, sâu đục bắp...
Cây lạc	Đông xuân	Chắc củ - thu hoạch	Tuần 2 tháng 4, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 25.0°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 38.9mm. Điều kiện thời tiết ấm lên và mưa ít rất thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lạc củ đã đạt thành phẩm cũng như việc chăm sóc cây lạc sâu nhiều tuần mưa lớn xảy ra liên tiếp. Trong tuần, người dân cần chú ý: tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch các diện tích lạc củ đã già để tránh thiệt hại trong trường hợp có mưa lớn xảy ra; các diện tích lạc còn lại chú ý chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại: bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá, sâu khoang, sâu róm...
Cây sắn		Cây con - phát triển thân lá	Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 2.9°C, tuần trước nhiệt độ không khí trung bình đạt 22.1°C); lượng mưa tuần này của khu vực đạt 38.9mm (giảm 156.0mm so với tuần trước). Nền nhiệt độ trong tuần thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển; lượng mưa trong tuần này của khu vực mặc dù khá thấp, tuy nhiên, từ nhiều tuần trước khu vực Trung Trung Bộ có mưa khá nhiều, do đó, vẫn bảo đảm nhu cầu về nước của cây sắn. Trong tuần, bệnh khảm lá do virus tiếp tục phát sinh gây hại, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến để chủ động phòng trừ kịp thời.

Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Cây ăn quả có múi trong khu vực tiếp tục trong nhiều giai đoạn. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần có xu thế tăng, lượng mưa giảm mạnh rất thuận lợi cho việc chăm sóc giúp cây ăn quả có múi sinh trưởng khỏe mạnh sau thời kỳ mưa lớn xảy ra. Người dân cần chú ý các biện pháp chăm sóc giúp cây ăn quả có múi sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh gây hại và điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần cần chú ý: sâu vẽ bùa, bệnh muội đen, bệnh chảy gôm, sâu đục thân/cành...
Cây cao su		Ra lá non - ổn định tầng lá	Tuần 2 tháng 4, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 21.8-28.3°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 38.9mm. Cây cao su hiện đang sinh trưởng và phát triển khá tốt. Cần chú ý theo dõi chặt chẽ một số bệnh gây hại như bệnh rụng lá Corynespora, bệnh rụng lá đốm tròn, loét sọc miệng cao, xì mũ,... để có biện pháp phòng trừ kịp thời hạn chế lây lan.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 21.0-37.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 28-30.5°C, tổng lượng mưa là 5.0-10.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa không đáng kể. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý chủ động nguồn nước để tưới kịp thời cho các loại cây trồng; tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh; tích cực theo dõi và giám sát các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để kịp thời có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng