


Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 5 năm 2022


I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 5 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 21.5 - 28.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.9°C, tổng lượng mưa là 52.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể bằng tuần này tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 48mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 13.3\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 27.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 10.0\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-15/5, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 15/5 trời chuyển mát. Từ ngày 16-21/5, có mưa vài nơi, từ ngày 17 trưa chiều trời nắng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.3	23.0	26.1	4.4
Trong tuần	28.3	21.5	24.9	52.4
Tuần tới	30.0-33.0	20.0-23.0	25.0-28.0	50.0-110.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Trỗ - ngậm sữa	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng $21.5 - 28.3^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 24.9°C , tổng lượng mưa là 52.4mm , nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là $25-32^{\circ}\text{C}$, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp cho lúa phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng $25.0-28.0^{\circ}\text{C}$, lượng mưa dự báo trong khoảng $50.0-110.0\text{mm}$, nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả phát triển là từ $23-29^{\circ}\text{C}$, có thể nhận thấy tuần tới có nhiệt độ phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây; tuy nhiên sắp vào thời kỳ mưa bão đồng thời lượng mưa dự báo tuần kế tiếp cao, có thể xuất hiện ngày mưa lớn kéo dài do đó cần tiến hành tía thưa cành

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			khô, cành bị sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng cho quả phát triển cũng như hạn chế gãy cành khi mưa lớn xảy ra đồng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo khuyến cáo.
Cây ngô	Xuân	Phát triển bấp	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 22-25 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.5 - 28.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.9°C, tổng lượng mưa là 52.4mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần thích hợp cho ngô phát triển; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn.
Cây nhãn		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 21.5 - 28.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.9°C, tổng lượng mưa là 52.4mm, cây nhãn đang trong giai đoạn quả non và phát triển quả - đây là giai đoạn nhãn cần nhiều nước, có thể nhận thấy tuần này nhiệt độ và lượng mưa tương đối phù hợp cho nhãn phát triển, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc định kỳ để làm sạch lá.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.5 - 28.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.9°C, tổng lượng mưa là 52.4mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 5 thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học trừ nhện phun định kỳ cho cây chè.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.5 - 28.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.9°C, tổng lượng mưa là 52.4mm, dự báo tuần kế tiếp có lượng mưa tăng mạnh, cần chủ động khơi thông mương rãnh thoát nước đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sâu xanh, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây lạc xuân	Xuân	Đâm tía - phát triển củ	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.5 - 28.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.9°C, tổng lượng mưa là 52.4mm, trong thời kỳ này lạc yêu cầu nhiệt độ cao, ẩm độ đầy đủ, dinh dưỡng nhiều và phản ứng rất nhạy với các yếu tố đó. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng trong khu vực tuần này phù hợp cho lạc phát triển, tuy nhiên cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc trừ sâu đạt chuẩn với liều lượng hợp lý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 25.0-28.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-110.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng so với tuần này, người dân cần có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả đồng thời chủ động bơm tiêu nước khỏi đồng ruộng khi mưa lớn xảy ra.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng