



Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 1 tháng 6 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 6 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 23.8 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 176.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 21.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 43.6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 26.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 16.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-13/6 và ngày 16/6, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng khu vực Sơn La-Hòa Bình ngày 13/6 có nắng nóng. Từ chiều tối 13-15/6, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 17-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.6	19.4	24.0	198.0
Trong tuần	29.3	23.8	26.6	176.4
Tuần tới	33.0-36.0	23.0-26.0	28.0-31.0	100.0-200.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Chiêm xuân	Chín sữa – chín sấp – thu hoạch	Tuần 1 tháng 6, nền nhiệt độ khu vực Tây Bắc có xu thế tăng, lượng mưa có xu thế giảm. Cụ thể: nhiệt độ tuần này của khu vực tăng đáng kể so với tuần trước (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình $2.6^{\circ}\text{C}$ ), lượng mưa trong tuần này của khu vực giảm 21.6mm so với tuần trước ( tuần trước lượng mưa của khu vực đạt 198.0mm). Trong tuần có mưa khá nhiều gây ảnh hưởng đến công tác thu hoạch các diện tích lúa chiêm xuân đã cho thu hoạch cũng như các diện tích lúa mùa sớm đang trong giai đoạn gieo mạ - cấy. Trong thời gian tới, người dân cần lưu ý khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa chiêm xuân đã chín với tiêu chí “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do mưa lớn gây ra, đồng thời chuẩn bị đất cho gieo trồng vụ mùa theo đúng khung lịch thời
	Mùa sớm	Gieo mạ - cấy	

			vụ. Các diện tích lúa mùa sớm đã gieo cấy, cần căn cứ vào tình hình thời tiết và nhu cầu của cây lúa theo từng thời kỳ để có các biện pháp điều tiết nước hợp lý cho cây lúa. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn... phát sinh gây hại trên lúa chiêm xuân; ốc bươu vàng, chuột... phát sinh gây hại trên lúa mùa sớm.
Cây ngô	Hè thu	Gieo trồng – 7 lá	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 23.8-29.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 176.4mm. Có thể nhận thấy, nhiệt độ của khu vực trong tuần khá phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Trong giai đoạn mới trồng – cây con, cây ngô không cần nhiều nước, việc đất đai quá ẩm ướt trong thời kỳ này sẽ khiến cho cây ngô sinh trưởng kém. Do đó, với lượng mưa trong tuần của khu vực như trên, người dân cần chú ý thoát nước cho các diện tích ngô (nhất là các khu vực trũng thấp). Sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu keo mùa thu, sâu cuốn lá, bệnh chết héo cây con...
Cây lạc	Xuân 2022	Chắc củ - thu hoạch	Cây lạc trong khu vực Tây Bắc hiện đã chuyển sang giai đoạn chắc củ - thu hoạch. Trong tuần này, khu vực Tây Bắc tiếp tục có mưa với lượng mưa tương đối nhiều. Do đó, người dân cần tập trung thu hoạch các diện tích lạc đã già (lưu ý thu hoạch vào những ngày tạnh ráo), các diện tích chưa thu hoạch cần có các biện pháp để tiêu nước kịp thời khi mưa lớn xảy ra để hạn chế tối đa thiệt hại. Do các diện tích lạc đã cho thu hoạch nên các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc không đáng kể.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Quả nhỏ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 26.6°C, lượng mưa của khu vực đạt 176.4mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ của khu vực trong tuần khá thuận lợi cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối nhiều, tại các khu vực trũng thấp cần chú ý thăm vườn thường xuyên và kịp thời có các biện pháp xử lý để tránh hiện tượng úng nước quanh gốc cây ăn quả có múi. Sâu đục thân, sâu đục quả, rệp... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi cần chú ý.

Cây nhãn		Phát triển quả	Tương tự như đối với cây ăn quả có múi, trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ khá thuận lợi cho cây nhãn sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, cần chú ý hiện tượng úng nước quanh gốc nhãn tại các khu vực trũng thấp khi mưa lớn xảy ra. Ngoài ra, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại trên cây nhãn: bọ xít nâu, sâu đục quả, bệnh sương mai...
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này cơ bản khá phù hợp với sinh trưởng của cây chè, tuy nhiên lượng mưa trong tuần của khu vực khá cao (176.4mm). Do đó, để bảo đảm cho cây chè sinh trưởng thuận lợi, người dân nên chủ động các phương án để kịp thời thoát nước cho cây chè ở các khu vực trũng thấp (tạo các đường thoát nước để tránh úng nước quanh gốc cây chè). Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh phòng lá thối búp... người dân cần chú ý theo dõi và chủ động phòng trừ kịp thời.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.0-36.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa là 100.0-200.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa khá cao. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý: tập trung thu hoạch nốt các diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022, sau thu hoạch cần khẩn trương vệ sinh lại đồng ruộng, làm đất để tiến hành gieo trồng vụ Hè thu 2022; Đối với các diện tích cây trồng hè thu đã xuống giống gieo trồng và các loại cây trồng khác cần chú ý điều tiết nước hợp lý kết hợp chăm sóc bón phân để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi và tác động của sâu bệnh hại; Ngoài ra, cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**