



Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
Tuần 1 tháng 5 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 5 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 21.8 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 84.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 34.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 27.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 10 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 13-14/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng ngày 13 vùng núi có nơi nắng nóng. Từ ngày 15-16/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 17-21/5, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.9	23.1	27.5	49.8
Trong tuần	26.6	21.8	24.2	84.7
Tuần tới	32.0-35.0	22.0-25.0	27.0-30.0	50.0-110.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 1 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Chín – thu hoạch	Tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 24.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 84.7mm. Mưa lớn xảy ra tập trung chủ yếu trong các ngày cuối tuần gây khó khăn cho công tác thu hoạch các diện tích lúa đã chín cũng như gây thiệt hại cho các diện tích lúa chưa được thu hoạch. Do đó, người dân cần khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã chín, các diện tích chưa kịp thu hoạch cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp giúp tiêu thoát nước kịp thời ở các khu vực trũng thấp, tránh để cây lúa bị úng nước lâu sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng của hạt thóc khi thu hoạch. Cây lúa hiện đang trong giai đoạn thu hoạch, do đó, sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần

			không đáng kể.
Cây ngô	Đông xuân	Thu hoạch	Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ trong tuần này có xu thế giảm đáng kể so với tuần trước, trong khi đó, lượng mưa trong tuần này tăng mạnh so với tuần trước. Trong điều kiện thời tiết mưa lớn xảy ra cục bộ, nhiều khu vực trũng thấp bị úng nước gây ảnh hưởng lớn đến các diện tích ngô Hè thu mới xuống giống. Để hạn chế tối đa thiệt hại do úng nước gây ra, người dân cần tích cực kiểm tra đồng ruộng (nhất là các khu vực trũng thấp), kịp thời tiêu thoát nước cho các diện tích ngô. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu đục thân, sâu đục bắp tiếp tục gây hại trên các diện tích ngô Đông xuân.
	Hè Thu	Xuống giống – cây con	
Cây lạc	Đông xuân	Thu hoạch	Tương tự như đối với cây ngô, cây lạc trong tuần này hiện trong các giai đoạn thu hoạch - xuống giống vụ mới. Nền nhiệt trong tuần này của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lạc. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực mặc dù không quá cao nhưng mưa phân bố không đồng đều, mưa lớn xảy ra chủ yếu trong ít ngày cuối tuần khiến cho một số diện tích trồng lạc ở các khu vực trũng thấp trong khu vực bị ngập úng. Việc ngập úng lâu ngày sẽ khiến các diện tích lạc mới trồng bị chết, các diện tích lạc đang thu hoạch sẽ có nguy cơ mọc mầm (thậm chí thối hạt). Do đó, người dân cần kịp thời tiêu thoát nước cho các diện tích lạc bị úng nước. Ngoài ra, cần khẩn trương thu hoạch các diện tích lạc đã già, sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp lại ruộng để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng sâu bệnh gây hại.
	Hè Thu	Xuống giống – cây con	
Cây rau các loại		Phát triển thân lá – thu hoạch	Tuần 1 tháng 5, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 21.8-26.4°C. Có thể nhận thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây rau các loại. Lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 84.7mm, mưa tập trung chủ yếu vào các ngày cuối tuần khiến một số diện tích rau bị dập nát, ngập úng. Trong quá trình chăm

			sóc, người dân cần nhanh chóng tiêu thoát nước kịp thời cho các diện tích rau đang bị úng nước, ngoài ra cần tiến hành thu hoạch các diện tích rau đã đạt thành phẩm; đối với các diện tích rau còn lại cần tiến hành dọn dẹp lại ruộng, nhổ bỏ những diện tích rau đã bị dập nát. Trong tuần, một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây rau các loại: sâu tơ, sâu khoang, sâu xám, bọ nhày, nhện...
Cây sắn	Đông xuân	Phát triển thân lá	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này có xu thế giảm đáng kể so với tuần trước do ảnh hưởng của không khí lạnh (với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 3.3°C), lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 84.7mm. Lượng mưa trong tuần của khu vực không quá cao, tuy nhiên do mưa tập trung chủ yếu trong các ngày cuối tuần khiến một số diện tích trồng sắn ở các khu vực trũng thấp bị úng nước. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý khơi thông rãnh ruộng, tạo đường thoát nước kịp thời cho cây sắn. Trong tuần, đối tượng bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục phát sinh gây hại, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến để kịp thời có các biện pháp phòng trừ.
	Hè thu	Xuống giống	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Cây ăn quả có múi trong tuần này tiếp tục trong nhiều giai đoạn. Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực có xu thế giảm đáng kể do không khí lạnh, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 84.7mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần không thực sự thuận lợi cho cây ăn quả có múi phát triển. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý thoát nước cho các khu vực trồng cây ăn quả trũng thấp bị úng nước do mưa lớn trong tuần gây ra. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân, bệnh chảy gôm, bệnh muội đen...
Cây cao su		Ổn định tầng lá – khai thác mủ	Tuần 1 tháng 5, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 24.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 84.7mm. Cây cao su trong tuần tiếp tục trong giai đoạn ổn định tầng lá, một số

			diện tích đã cho khai thác mỏ. Nhiệt độ thích hợp cho cây cao su từ 25.0-30.0°C. Có thể nhận thấy, điều kiện khí hậu trong tuần cơ bản thuận lợi cho cây cao su sinh trưởng cũng như khai thác mỏ. Trong các giai đoạn này, cần chú ý các đối tượng: bệnh xì mũ , bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh nấm hồng...
--	--	--	---

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 22.0-35.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa là 50.0-110.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa ở vừa phải. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được lưu ý: Đối với cây lúa và cây hoa màu vụ Đông xuân cần khẩn trương thu hoạch các diện tích đã chín, sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp lại ruộng, tiến hành làm đất để kịp xuống giống vụ Hè thu theo đúng lịch thời vụ gieo trồng của khu vực. Đối với các loại cây trồng còn lại, cần tiếp tục các biện pháp chăm sóc (làm cỏ, bón phân, điều tiết nước cân đối và hợp lý) để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh. Ngoài ra, cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên từng loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng