



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 2 tháng 5 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 19.1 - 25.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.1°C, tổng lượng mưa là 80.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 26.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 21.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 219.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 33.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ 25/5-01/6, có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng ngày 25/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 28/5 cục bộ có nơi nắng nóng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí (°C) | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 24.6 | 17.1 | 20.8 | 106.9 |
| Trong tuần | 25.2 | 19.1 | 22.1 | 80.5 |
| Tuần tới | 31.0-34.0 | 20.0-23.0 | 25.5-28.5 | 200.0-400.0 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Khuyến cáo, lưu ý |
|-----------|------------|-------------------------------|--|
| Cây lúa | Chiêm xuân | Trỗ - chín - thu hoạch | Trong tuần này, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 22.1°C, lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 80.5mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần khá phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Người dân cần nhanh chóng thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Sau thu hoạch, cần tiến hành dọn dẹp sạch ruộng để chuẩn bị đất trồng tránh các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại lây lan sang vụ sau. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: rầy các loại, bọ xít dài, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, khô vằn... |
| Cây ngô | | Trỗ cò - thâm râu - thu hoạch | Đại đa số các diện tích ngô trong khu vực hiện đang trong giai đoạn trỗ cò - phun râu - phát triển bắp, một số diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này có xu thế tăng (với mức tăng của nhiệt độ |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| | | | không khí trung bình 1.3°C), lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 80.5mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Sâu đục thân, sâu đục bắp, bệnh vàng lá... là một số đối tượng gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý. |
| Cây lạc | Xuân 2022 | Củ non - chắc củ | Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 19.1-25.2°C, lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 80.5mm. Trong tuần, cây lạc hiện đang trong giai đoạn củ non - chắc củ. Sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần chủ yếu là các đối tượng: sâu ăn lá, bệnh rỉ sắt, bệnh đốm lá... trong quá trình chăm sóc, người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ. |
| Cây đậu tương | | Ra hoa – phát triển quả | Trong tuần này, cây đậu tương chuyển sang giai đoạn ra hoa – phát triển quả. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này có xu thế tăng, thời tiết ẩm hơn khiến cho cây đậu tương sinh trưởng tốt hơn. Lượng mưa trong tuần này giảm nhẹ so với tuần trước. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần này cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây đậu tương. Do điều kiện thời tiết tốt hơn, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại gia tăng, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây đậu tương trong tuần cần chú ý: sâu tơ, sâu khoang, rệp, bọ xít... |
| Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi) | | Quả nhỏ | Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần này cơ bản phù hợp cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong giai đoạn phát triển quả, người dân cần chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và nước cho cây ăn quả có múi để giúp cây ăn quả có múi sinh trưởng khỏe mạnh và bảo đảm cho quả phát triển tốt nhất. Ngoài ra, cần đặc biệt chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi: sâu đục thân, sâu đục quả... khi phát hiện cần kịp thời có các biện pháp để diệt trừ kịp thời. |
| Cây vải | | Quả chín – thu hoạch | Trong tuần này, cây vải sớm trong khu vực Việt Bắc đã bước vào đầu vụ thu hoạch, thời tiết của khu vực trong tuần với nền nhiệt độ trung bình đạt 22.1°C và lượng mưa đạt 80.5mm cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây vải. Trong tuần, người dân đã bắt đầu tiến |

| | | | |
|---------|--|-------------------------------------|---|
| | | | hành thu hoạch những diện tích vải chín; người dân nên tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, không mưa để thu hoạch tối đa các diện tích vải đã chín (tranh thủ giá thành của quả vải đầu vụ tương đối cao). Sâu bệnh gây hại trên quả vải trong tuần chủ yếu là đối tượng: sâu đục cuống quả, bọ xít. |
| Cây chè | | Chăm sóc – phát triển búp – thu hái | Tuần 2 tháng 5, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 19.1-25.2°C, lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 80.5mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần cơ bản khá phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Trong tuần, cây chè tiếp tục trong các giai đoạn chăm sóc – phát triển búp – thu hái, người dân cần được chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè: bọ xít muỗi, rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ, sâu đục thân... |

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 20.0-34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.5-28.5°C, tổng lượng mưa là 200.0-400.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa tăng mạnh. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý tranh thủ những ngày thời tiết khô ráo để thu hoạch tối đa các diện tích cây trồng đã cho thu hoạch, sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp lại đồng ruộng để chuẩn bị cho vụ tiếp theo; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời có các biện pháp tiêu thoát nước cho cây trồng (nhất là các cây trồng vụ Hè thu mới xuống giống), đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại trên cây trồng và kịp thời các biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng