



Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 7 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 7 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 27.4 - 33.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 125.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 80.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 41.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 65.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 6.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-15/7, phía Bắc đêm 11 và ngày 12/7 có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 16-21/7 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng ngày 16/7 và ngày 20-21/7 có nơi nắng nóng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.8	26.7	30.8	44.9
Trong tuần	33.5	27.4	30.4	125.6
Tuần tới	34.0-37.0	24.0-27.0	29.0-32.0	40.0-80.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu	Đứng cái - làm đòng	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ 27.4 - 33.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 125.6mm, diện tích lúa Hè thu đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng, nhiệt độ yêu cầu từ 25-32°C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây mía		Vươn lóng	Nhiệt độ tốt nhất cho cây mía giai đoạn phát triển thời kỳ vươn lóng là 28-35°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.4 - 33.5°C,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			<p>nhệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 125.6mm, số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tương đối phù hợp cho mía phát triển giai đoạn này, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương diệt trừ bằng các loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.</p>
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	<p>Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 27.4 - 33.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 125.6mm, điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp cho thông phát triển; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả.</p>
Cây sắn		Phát triển củ	<p>Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 27.4 - 33.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 125.6mm, có thể nhận thấy nhiệt độ và lượng mưa trong tuần tương đối phù hợp cho sắn phát triển, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần kịp thời áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả tránh lây lan diện rộng.</p>
Cây ngô	Hè thu	Cây con	<p>Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 27.4 - 33.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 125.6mm; có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần tương đối cao cho ngô phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.</p>
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	<p>Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối cao dự báo dao động trong khoảng 34.0-37.0°C; lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 40.0-80.0mm, có thể nhận tuần kế tiếp có nhiệt độ dự báo tương đối cao, do đó cần chủ động đảm bảo nước tưới cho cây trồng đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhảy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.</p>
Cây ăn		Quả non	<p>Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy</p>

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
quả			nhiệt độ tuần này dao động từ 27.4 - 33.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 125.6mm, số liệu thống kê cho thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho quả phát triển; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng biện pháp trừ sâu và bệnh hiệu quả.
Cây cà phê		Phát triển quả	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 29.0-32.0 độ C và lượng mưa dao động trong khoảng 40.0-80.0mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh nấm hồng, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần phun thuốc trừ sâu hiệu quả và kịp thời.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo trung bình trong khoảng 29.0-32.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-80.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa dự báo giảm, do đó người dân cần thực hiện một số biện pháp chống nắng cho cây trồng khi nhiệt độ tối cao xảy ra như: phủ rơm, rạ, trấu trên mặt ruộng, làm giàn lưới che đối với rau màu và tưới 2-3 ngày/lần đối với cây ăn quả, đồng thời có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng