



Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 7 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 7 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 27.8 - 33.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 125.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 42.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 27.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 65.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 6.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-15/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 16-19/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng ngày 16/7 cục bộ có nắng nóng. Từ đêm 19-21/7, có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	35.5	27.4	31.4	82.6
Trong tuần	33.8	27.8	30.8	125.4
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	40.0-80.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà chính vụ	Bén rễ - hồi xanh	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần 1 tháng 7 có nhiệt độ dao động trong khoảng 27.8 - 33.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 125.4mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-30 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần không thực sự thuận lợi cho lúa phát triển giai đoạn này; cần lưu ý một số sâu bệnh chính như: bệnh thối thân, nhện gié; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 27.8 - 33.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 125.4mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển và nuôi dưỡng quả; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh seọ, rệp

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trừ sâu kịp thời và hiệu quả.
Cây ngô	Hè thu	Xoáy nõn	Nhiệt độ thích hợp cho ngô Hè thu giai đoạn xoáy nõn là 25 - 32 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.8 - 33.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 125.4mm, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho ngô phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phân bón hợp lý tăng sức đề kháng cây trồng đồng thời sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây nhãn		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 27.8 - 33.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 125.4mm, cây nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả, một số diện tích nhãn đã thu hoạch quả - đây là giai đoạn nhãn cần nhiều nước, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng trong tuần tương đối phù hợp cho nhãn phát triển quả, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh phấn trắng, xén tóc; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: quét dọn vườn thông thoáng, ánh sáng xuyên qua được tán lá sẽ hạn chế bệnh.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.8 - 33.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 125.4mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 7 tương đối thuận lợi cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học trừ nhện phun định kỳ cho cây chè.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 30.98 độ C, tổng lượng mưa là 125.4mm; điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho rau màu sinh trưởng và phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng các loại thuốc trừ sâu phù hợp.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây sắn		Phát triển thân lá	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.8 - 33.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 125.4mm, trong thời kỳ này sản xuất cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nước, điều kiện khí tượng trong tuần tương đối phù hợp, cần lưu ý một số sâu bệnh như: sùng trắng, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả, tránh lây lan ra diện tích cây trồng khác.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo trung bình khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-80.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi, người dân nên chủ động thăm ruộng vườn, sớm phát hiện sâu bệnh và sử dụng biện pháp diệt trừ kịp thời và hiệu quả, tránh lây lan diện rộng.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng