



Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 7 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 7 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 25.6 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 187.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 62.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 41.0\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 142.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5.0\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-28/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ ngày 24/7 có nơi nắng nóng. Từ đêm 28-31/7, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.8	27.8	30.8	125.4
Trong tuần	33.9	25.6	29.7	187.6
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	30.0-60.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Bén rễ - hồi xanh	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng $25.6 - 33.9^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình $29.7^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 187.6mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là $25-30^{\circ}\text{C}$ , trong tuần qua xuất hiện một số ngày mưa lớn, do đó, người dân cần chủ động khơi thông mương rãnh thoát nước đảm bảo tiêu nước kịp thời; cần lưu ý một số sâu bệnh chủ yếu như: bệnh đạo ôn, bọ xít đen; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng một số loại thuốc phòng trừ sâu bệnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ $25.6 - 33.9^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình $29.7^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 187.6mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bọ xít, sâu đục cuống quả; khi

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng biện pháp diệt trừ sâu và bệnh hiệu quả và kịp thời.
Cây ngô	Hè thu	Xoáy nõn - trổ cờ	Nhiệt độ thích hợp cho ngô Hè thu giai đoạn xoáy nõn - trổ cờ là 22 -25 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.6 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 187.6mm, trong tuần xuất hiện những trận mưa cường độ lớn, do đó, người dân cần đảm bảo chủ động tiêu thoát nước kịp thời tránh úng ngập đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu keo mùa thu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng kịp thời các biện pháp diệt trừ hiệu quả tránh lây lan diện rộng.
Cây nhãn		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.6 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 187.6mm, cây nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả, một số diện tích nhãn đã thu hoạch, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần không thực sự thuận lợi cho nhãn phát triển giai đoạn này, những trận mưa cường độ lớn có khả năng làm gãy cành, rụng quả nhãn; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên kịp thời phun thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.6 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 187.6mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 7 thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mất lưới, nhện đỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh người dân nên sử dụng thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 29.7 độ C, tổng lượng mưa là 187.6m, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho rau màu phát triển, tuy nhiên trong tuần có những trận mưa lớn do đó người dân cần chủ động tiêu thoát nước cho rau màu khi mưa lớn xảy ra, tránh ngập úng diện rộng đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sâu

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			vẽ bùa, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép và đúng liều lượng.
Cây sắn		Phát triển thân lá	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.6 - 33.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.7°C, tổng lượng mưa là 187.6mm, trong thời kỳ này sắn yêu cầu được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nước, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho sắn phát triển giai đoạn này, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sùng trắng, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ dự báo tăng trong khi lượng mưa dự báo giảm, do đó bên cạnh việc sử dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả cho từng loại cây thì người dân nên chú động cung cấp đủ nước cho cây trồng.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**