



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 7 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.5 - 33.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 72.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể bằng tuần này tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 115.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 17.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 02-04/8 và từ ngày 09-10/8, chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 04-08/8 và từ ngày 10-12/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.9	25.6	29.7	187.6
Trong tuần	33.4	26.5	30.0	72.3
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà chính vụ	Hồi xanh - đẻ nhánh	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 26.5 - 33.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 72.3mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-30 độ C, trong tuần xuất hiện những ngày có nhiệt độ cao, do đó cần đảm bảo cung cấp đủ nước cho lúa đồng thời lưu ý một số sâu bệnh chính như: bệnh đốm vòng, ốc bươu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên áp dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời và hiệu quả.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng 26.5 - 33.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 72.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển; cần

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Hè thu	Xoáy nõn - trổ cờ	Nhiệt độ thích hợp cho ngô Hè thu giai đoạn trổ cờ là 22 - 25 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.5 - 33.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 72.3mm, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần tương đối cao so với nhu cầu nhiệt độ giai đoạn phát triển này của ngô, người dân cần chủ động tưới đủ nước cho ngô đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khô cỏn, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt tiêu chuẩn cho phép.
Cây nhãn		Phát triển quả - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.5 - 33.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 72.3mm, hiện nay diện tích nhãn đang thu hoạch rộ, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, sâu đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên kịp thời phun thuốc trừ sâu hiệu quả tránh lây ra diện rộng.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.5 - 33.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 72.3mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 7 không thực sự thích hợp cho chè phát triển; người dân cần chủ động cung cấp đủ nước cho chè đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ; ngay khi phát hiện sâu bệnh cần kịp thời phun thuốc trừ sâu cho diện tích chè đã nhiễm bệnh.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 30.0 độ C, tổng lượng mưa là 72.3mm; điều kiện khí hậu không thực sự phù hợp cho rau màu, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh chết cây con, sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương phun thuốc diệt trừ sâu bệnh hiệu quả, tránh lây lan sang diện tích khác.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây sắn		Phát triển thân lá	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.5 - 33.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.0°C, tổng lượng mưa là 72.3mm, trong thời kỳ này sắn yêu cầu được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nước, do đó cần chủ động bổ sung nước tưới cho diện tích sắn đặc biệt những ngày nắng nóng đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh sùng trắng gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp và hiệu quả cho sắn.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và tổng lượng mưa tương đối phù hợp cho các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng trong khu vực, người dân nên kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để kịp thời phát hiện và diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng