



Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 7 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 7 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 24.1 - 32.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.2°C, tổng lượng mưa là 83mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 27.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 13mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 6.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 23-28/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ ngày 24/7 có nơi nắng nóng. Từ đêm 28-31/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.1	23.9	27.0	78.5
Trong tuần	32.3	24.1	28.2	83.0
Tuần tới	33.0-36.0	23.0-26.0	28.0-31.0	50.0-90.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Cây – hồi xanh - đẻ nhánh - đẻ rộ	Tuần 2 tháng 7, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 24.1-32.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 83.0mm. Nền nhiệt độ của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lúa, tuy nhiên, lượng mưa của khu vực ở mức trung bình không đủ đáp ứng nhu cầu của cây lúa, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Để bảo đảm cho sinh trưởng của cây lúa, người dân cần chú ý bổ sung nước cho lúa theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng, cụ thể: duy trì mực nước trong ruộng khoảng 3cm cho cây lúa mới cấy - hồi xanh, khi cây lúa chuyển sang giai đoạn đẻ nhánh nên áp dụng biện pháp tưới “Uot-khô xen kẽ” cho đến khi cây lúa đứng cái – làm đòng. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: ốc brou vàng, rầy nâu/rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ... người dân cần hết sức lưu ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối

			tượng gây hại để chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời tránh để các đối tượng gây hại gia tăng gây khó khăn cho công tác phòng trừ cũng như ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.
Cây ngô	Hè thu	2-4 lá, xoã nõn - trở cò	Trong tuần này, cây ngô trong khu vực Việt Bắc đang trong các giai đoạn 2-4 lá, xoã nõn - trở cò. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này có xu thế tăng (với mức của nhiệt độ không khí trung bình 1.2°C, tuần trước nhiệt độ không khí trung bình của khu vực đạt 27.0°C), lượng mưa của khu vực trong tuần này tăng không đáng kể so với tuần trước (tuần này lượng mưa của khu vực đạt 83.0mm, tăng 4.5mm so với tuần trước). Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần không thực sự thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô. Sâu xám, sâu keo mùa thu, châu chấu... tiếp tục là các đối tượng gây hại trên cây ngô trong tuần cần được chú ý.
Cây lạc	Hè thu 2022	Cây con – phát triển thân lá	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, trong tuần này nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 28.2°C khá thích hợp với sinh trưởng của cây lạc; lượng mưa của khu vực đạt 83.0mm, chú ý tưới thêm nước cho cây lạc tại các khu vực khô hạn thiếu nước. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu xám, sâu keo mùa thu, bệnh lở cổ rễ....
Cây sắn		Phát triển thân lá	Cây sắn trong khu vực Tây Bắc trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá. Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng. Trong điều kiện nắng nóng, lượng mưa ở mức trung bình người dân nên tưới thêm nước bổ sung cho cây sắn sinh trưởng khỏe mạnh. Bộ phận trắng, bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn. Người dân cần chú ý theo dõi và chủ động phòng trừ để tránh cho các đối tượng gây hại gia tăng mức độ gây khó khăn cho công tác phòng trừ.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt,		Phát triển quả	Tuần 2 tháng 7, nền nhiệt độ của khu vực Tây Bắc dao động trong khoảng 24.1-32.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 83.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho cây ăn

bưởi)			quả có múi sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên lượng mưa của khu vực chưa đủ đáp ứng nhu cầu của cây (nhất là giai đoạn phát triển quả). Do đó, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Ngoài ra, cần tiếp tục chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi: sâu đục thân, nhóm nhện nhỏ, ruồi đục quả, bọ trĩ...
Cây nhãn		Thu hoạch	Trong tuần này, cây nhãn trong khu vực Tây Bắc đã bắt đầu cho thu hoạch. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần khá cao, lượng mưa ở mức trung bình là điều kiện tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích nhãn đã chín. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thu hoạch các diện tích nhãn có thể thu hoạch. Sâu đục cuống quả là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây nhãn trong tuần.
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Cây chè trong khu vực Tây Bắc trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 28.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 83.0mm. Cây chè hiện đang sinh trưởng và phát triển bình thường. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh phòng lá thối búp...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.0-36.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa là 50.0-80.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tương đối cao, lượng mưa tương ở mức trung bình. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý: chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; có các biện pháp che chắn nắng, làm mát cho cây trồng trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt; tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi; theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng