



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 7 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 23 - 31.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 55mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 28mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 16.1\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 60mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 11.7\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-04/8 và từ ngày 09-10/8, chiều tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng đêm 02/8 có mưa rào dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm 04-08/8 và từ đêm 10-12/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.3	24.1	28.2	83.0
Trong tuần	31.4	23.0	27.2	55.0
Tuần tới	32.0-35.0	23.0-26.0	27.5-30.5	80.0-150.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Cây – hồi xanh - đẻ nhánh - đẻ rộ - đứng cái – phân hóa đòng	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần này có xu thế giảm nhẹ so với tuần trước (với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình $1.0^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình tuần này đạt $27.2^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình tuần trước đạt $28.2^{\circ}\text{C}$ ), lượng mưa trong tuần này của khu vực cùng xu thế giảm với nhiệt độ (tuần này lượng mưa của khu vực đạt 55.0mm, giảm 28.0mm so với tuần trước). Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần này của khu vực tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây lúa; tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực khá thấp nên người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây lúa. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: sâu cuốn lá, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn...

Cây ngô	Hè thu	Xoáy nõn - trở cờ - phát triển bắp	Tuần 3 tháng 7, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ cơ bản khá thuận lợi đối với sinh trưởng của cây ngô. Lượng mưa trong tháng 7 của khu vực đạt 55.0mm. Trong điều kiện lượng mưa thấp, quá trình trở cờ - thụ phấn trên cây ngô diễn ra thuận lợi tạo tiền đề cho năng suất ngô thu hoạch được cao. Tuy nhiên, lượng mưa thấp không bảo đảm được nhu cầu về nước của cây ngô. Do đó, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô. Đồng thời trong quá trình chăm sóc, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô (sâu xám, sâu keo mùa thu, rệp hại cờ, sâu đục bắp) để kịp thời có các biện pháp phòng trừ.
Cây lạc	Hè thu 2022	Cây con – phát triển thân lá	Cây lạc trong khu vực Tây Bắc trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Nền nhiệt độ trong tuần này dao động trong khoảng 23.0-31.4°C, lượng mưa của khu vực đạt 55.0mm. Trong điều kiện thời tiết mưa tương đối thấp, để bảo đảm cho cây lạc sinh trưởng tốt nhất, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây lạc. Ngoài ra, cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu xám, bệnh lở cổ rễ...
Cây sắn		Phát triển thân lá	Theo số liệu thống kê cho thấy, lượng mưa trong tuần này của khu vực có xu thế giảm 28.0mm so với tuần trước. Là loại cây có khả năng chịu hạn rất tốt, trong điều kiện thời tiết mưa tương đối ít cây sắn vẫn sinh trưởng bình thường. Tuy nhiên, để giúp cây sắn sinh trưởng khỏe mạnh hơn, ở những nơi điều kiện thủy lợi cho phép, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây sắn. Trong tuần, cây sắn tiếp tục chịu tác động bởi bệnh khảm lá do virus, bộ phận trắng... phát sinh gây hại.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả	Cây ăn quả có múi trong khu vực Tây Bắc trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả. Nền nhiệt độ trung bình trong tuần này của khu vực đạt 27.2°C, điều kiện nhiệt độ khá phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 55.0mm, không đủ đáp ứng nhu cầu của cây ăn quả có múi trong giai đoạn này. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Bên cạnh đó, cần tiếp tục chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của

			các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi (sâu đục quả, bệnh loét, bệnh ghê sẹo...) để kịp thời có các biện pháp phòng trừ.
Cây nhãn		Thu hoạch	Tuần 3 tháng 7, khu vực Tây Bắc tiếp tục cho thu hoạch nhãn, nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực khá thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích nhãn đã chín bảo đảm chất lượng. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch các diện tích nhãn đã chín. Sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn trong tuần chủ yếu vẫn là các đối tượng: sâu đục thân, sâu đục cuống quả....
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 23.0-31.4°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 55.0mm. Trong điều kiện mưa ít, cây chè sinh trưởng kém khiến cho năng suất búp chè thu hoạch được cũng giảm sút. Để bảo đảm cho sinh trưởng của cây chè trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây chè. Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây chè trong tuần.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.0-35.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa là 80.0-150.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu về nước, phân bón cho cây trồng; Có các biện pháp che chắn, làm mát cho cây trồng trong điều kiện thời tiết nắng nóng; Tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**