



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 7 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 24.2 - 33.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.9°C, tổng lượng mưa là 58.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 89.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 19.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 13.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-09/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 10-12/8, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.0	25.5	28.7	148.0
Trong tuần	33.7	24.2	28.9	58.8
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu 2022	Đẻ nhánh – làm đòng - trổ chín – thu hoạch	Trong tuần này, cây lúa trong khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục trong các giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng - trổ chín, một số diện tích lúa sớm đã cho thu hoạch. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đối cao, cơ bản khá phù hợp cho sinh trưởng của cây lúa. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 58.8mm; Đối với các diện tích lúa đang bước vào giai đoạn chín – thu hoạch, đây là điều kiện rất thuận lợi cho lúa chín cũng như công tác thu hoạch các diện tích lúa đã chín; Đối với các diện tích lúa còn lại, trong điều kiện thời tiết mưa tương đối thấp, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung đáp ứng đủ nhu cầu của cây lúa theo từng giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô

			văn, bệnh đen lép hạt...
Cây ngô	Hè thu	Phát triển thân lá - trổ cờ - thâm râu - thu hoạch	Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 28.9°C, lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 58.8mm. Lượng mưa trong tuần thấp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trổ cờ - thụ phấn trên cây ngô cũng như công tác thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Tuy nhiên, đối với các diện tích ngô còn lại, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô để đảm bảo cây ngô sinh trưởng tốt nhất. Bên cạnh đó, cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô để kịp thời có các biện pháp phòng trừ.
Cây lạc	Hè thu	Củ non – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 24.2-33.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 58.8mm. Tương tự như đối với cây ngô, thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lạc củ đã già. Đối với các diện tích lạc đang trong giai đoạn củ non, cần tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc: sâu xám, bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt...
Cây mía		Đẻ nhánh – vươn lóng	Cây mía trong khu vực Trung Trung Bộ đang trong giai đoạn đẻ nhánh – vươn lóng. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này của khu vực tương đối cao trong khi đó lượng mưa của khu vực khá thấp. Trong giai đoạn đẻ nhánh – vươn lóng, cây mía cần nhiều nước để sinh trưởng. Trong điều kiện lượng mưa của khu vực trong tuần tương đối thấp, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Rệp xo trắng, bọ phấn trắng... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây mía trong tuần.

Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Phát triển thân lá – nuôi củ	Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 0.2°C, tuần trước nhiệt độ không khí trung bình đạt 28.7°C), lượng mưa trong tuần này của khu vực có xu thế giảm so với tuần trước (lượng mưa tuần này của khu vực đạt 58.8mm, giảm 89.2mm) 24.2-33.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 58.8mm. Mặc dù sắn là loại cây có khả năng chịu hạn rất tốt, tuy nhiên lại sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện đầy đủ độ ẩm. Thiếu nước sẽ khiến cho cây sắn còi cọc, sinh trưởng kém và ảnh hưởng đến quá trình tích lũy tinh bột vào củ gây sụt giảm năng suất và chất lượng của củ sắn thành phẩm. Do đó, trong điều kiện thời tiết như trên, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây sắn. Đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại phát sinh trên cây sắn: bệnh khảm lá sắn do virus, bọ phấn trắng, rệp sáp...
	Hè thu 2022	Cây con – phát triển thân lá	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Tuần 3 tháng 7, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tương đối cao (nhiệt độ cao nhất đạt 33.7°C) trong khi đó lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp. Trong điều kiện nắng nóng, mưa không đáng kể, cây ăn quả có múi sinh trưởng kém. Để bảo đảm nhu cầu về nước cũng như làm mát cho cây ăn quả có múi trong điều kiện thời tiết nắng nóng, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân, ruồi đục quả, bệnh chảy gôm, bệnh muội đen...
Cây cao su		Khai thác mủ	Cây cao su trong khu vực Trung Trung Bộ trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa tương đối thấp, việc thiếu nước trong giai đoạn này khiến cho cây cao su sinh trưởng kém hơn, ảnh hưởng đến lượng mủ khai thác được. Do đó, để bảo đảm cho năng suất và sản lượng mủ cao su khai thác cũng như bảo đảm cho sinh trưởng của cây cao su, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây cao su trong điều kiện thời tiết

			mưa không đủ đáp ứng. Bệnh xì mũ, bệnh loét sọc miệng cao tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây cao su trong tuần.
--	--	--	---

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 24.0-36.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa là 30.0-60.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có nền nhiệt độ tương đối cao, lượng mưa không đáng kể. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý: Chủ động tưới thêm nước bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; Có các biện pháp che chắn nắng và làm mát cho cây trồng trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, làm cỏ, bón phân hợp lý cho cây trồng; Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng