



Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 1 tháng 7 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 7 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 23.6 - 30.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 114.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 45mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 27.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 39.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-19/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 19-21/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.5	23.6	27.0	159.8
Trong tuần	30.7	23.6	27.1	114.8
Tuần tới	33.0-36.0	23.0-26.0	28.0-31.0	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 1 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Cây – hồi xanh - đẻ nhánh - đẻ rộ	Tuần 1 tháng 7, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước (với mức biến động của nhiệt độ không khí trung bình 0.1°C, nhiệt độ không khí trung bình tuần này đạt 27.1°C). Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần này của khu vực tiếp tục phù hợp cho sinh trưởng của cây lúa trong các giai đoạn này. Lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 114.8mm (giảm 45.0mm so với tuần trước). Do lượng mưa trong tuần của khu vực không nhiều, cùng với việc thời tiết nắng nóng khiến lượng mưa trong tuần của khu vực không đủ đáp ứng nhu cầu của cây lúa. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lúa theo từng giai đoạn sinh trưởng. Ngoài ra chú ý công tác làm cỏ, bón phân, theo dõi và chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa: ốc bươu

			vàng, rầy các loại, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá...
Cây ngô	Hè thu	Gieo trồng – 9 lá – xoã nõn	Trong tuần này, cây ngô trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn gieo – 9 lá, một số diện tích đã chuyển sang giai đoạn xoã nõn. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 23.6-30.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 114.8mm. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lượng mưa không quá nhiều, để bảo đảm cho cây ngô sinh trưởng tốt, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô. Ngoài ra, cần chú ý xới đất vun gốc để giúp cho cây ngô đứng vững tránh đổ ngã khi có mưa to, tiến hành bón thúc cho cây ngô cân đối để giúp cây ngô sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh đốm lá...
Cây lạc	Hè thu 2022	Gieo – cây con	Cây lạc vụ Hè thu 2022 trong khu vực Việt Bắc hiện đã tiến hành gieo trồng, các diện tích trồng sớm đang phát triển cây con. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần tương đối thuận lợi cho sinh trưởng của cây lạc. Lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 114.8mm (chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cho cây lạc ở các khu vực thiếu nước). Trong tuần, cây lạc chịu tác động bởi các đối tượng: sâu xám, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời tránh để các đối tượng phát sinh gây hại nặng khiến cho cây lạc sinh trưởng kém cũng như gây khó khăn cho công tác phòng trừ.
Cây sắn		Phát triển thân lá	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 23.6-30.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 114.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối phù hợp cho sinh trưởng của cây sắn. Bệnh khảm lá virus, bộ phận trắng, rệp sáp bột hồng tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn cần chú ý.
Cây ăn quả có múi (cam,		Phát triển quả	Trong giai đoạn phát triển quả, cây ăn quả có múi cần rất nhiều nước. Lượng mưa của khu vực trong tuần này giảm đáng kể so với tuần trước (tuần này lượng mưa của khu vực đạt

quýt, bưởi)			114.8mm, giảm 45.0mm). Nhiệt độ trung bình tuần này của khu vực đạt 27.1°C, nhiệt độ cao nhất đạt 30.7°C. Thời tiết trong tuần chủ đạo là nắng nóng, mưa không nhiều do đó, người dân cần tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi để bảo đảm cho cây sinh trưởng khỏe mạnh. Ngoài ra, cần tiếp tục chú ý các đối tượng: sâu đục quả, sâu đục thân, bệnh muội đen... phát sinh gây hại.
Cây vải		Thu hoạch	Tuần 1 tháng 7, cây vải trong khu vực Việt Bắc đang vào cuối vụ thu hoạch. Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần cơ bản phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích vải đã chín. Người dân cần tập trung thu hoạch triệt để các diện tích vải còn lại trên cây để nhanh chóng chuyển sang chăm sóc sau thu hoạch. Do đại đa số các diện tích vải đã cho thu hoạch nên sâu bệnh gây hại trên cây vải không đáng kể, chủ yếu vẫn là các đối tượng: sâu đục thân, sâu đục cành tồn tại từ lâu trên cây vải.
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Cây chè trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Trong tuần này, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 27.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 114.8mm. Cây chè hiện đang sinh trưởng và phát triển bình thường. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần: rầy xanh, bọ cánh tơ, bệnh phòng lá thối búp...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.0-36.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa là 50.0-100.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tương đối cao, lượng mưa tương ở mức trung bình. Các loại cây trồng cần trong thời gian tới cần được chú ý: Đối với cây vải, cần tập trung thu hoạch các diện tích vải cuối vụ để chuyển sang giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch; Đối với các cây trồng nói chung (đặc biệt là cây lúa) cần chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; có các biện pháp che chắn nắng, làm mát cho cây trồng trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt; tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi; theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng