



Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 8 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 8 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.6 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 96.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 24.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 24.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 53.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-16/8, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 17-21/8, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.4	26.5	30.0	72.3
Trong tuần	32.5	26.6	29.5	96.6
Tuần tới	32.0-35.0	23.0-26.0	27.5-30.5	100.0-200.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà chính vụ	Đẻ nhánh rộ- cuối đẻ	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 26.6 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 96.6mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này, tuy nhiên do ảnh hưởng cơn bão số 2 gây mưa lớn nên cần đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời đồng thời lưu ý một số sâu bệnh chính như: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng các loại thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng 26.6 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 96.6mm, nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển giai đoạn này, cần lưu ý một số

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.
Cây ngô	Thu đông	Trồng - 3 lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô giai đoạn này là 25 - 30 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.6 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 96.6mm, do ảnh hưởng cơn bão số 2 gây mưa lớn gây ảnh hưởng đến diện tích ngô mới trồng do đó cần đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và kịp thời.
Cây nhãn		Phát triển quả - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.6 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 96.6mm, điều kiện khí hậu tuần 1 tháng 8 tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển này; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bồ hóng, dơi ăn quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng thuốc trừ sâu bệnh kịp thời và hiệu quả.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.6 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 96.6mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 8 tương đối thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm trắng, rầy xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học và thuốc trừ sâu đạt chuẩn phun định kỳ cho cây chè.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.6 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 96.6mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép, do ảnh hưởng cơn bão số 2 gây mưa lớn diện rộng, do đó cần chủ động khơi thông mương rãnh cũng như tiêu thoát nước kịp thời.
Cây		Phát triển	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
sắn		thân lá	cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.6 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5°C, tổng lượng mưa là 96.6mm, trong thời kỳ này sắn yêu cầu được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nước, do đó người dân cần chủ động tưới nước trong ngày nắng đồng thời tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn xảy ra do ảnh hưởng từ cơn bão số 2 đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp và hiệu quả cho sắn.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 100.0-200.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tuy nhiên tổng lượng mưa dự báo lớn (200mm) nên người dân cần chủ động bơm tiêu thoát nước cho diện tích cây trồng khi mưa lớn xảy ra đồng thời có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng