



Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 8 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 8 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.1 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.6°C, tổng lượng mưa là 237.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 140.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 63.0\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 162.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 8.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-29/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 29-31/8, có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.5	26.6	29.5	96.6
Trong tuần	31.1	26.1	28.6	237.4
Tuần tới	32.0-35.0	24.0-27.0	28.0-31.0	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà chính vụ	Đứng cái - phân hoá đòng	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng $26.1 - 31.1^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 28.6°C , tổng lượng mưa là 237.4mm , nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là $25-32^{\circ}\text{C}$, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này, tuy nhiên, tổng lượng mưa trong tuần lớn nên người dân cần chủ động tiêu thoát nước kịp thời đồng thời lưu ý một số sâu bệnh chính như: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc phòng trừ sâu bệnh theo khuyến cáo.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng $26.1 - 31.1^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 28.6°C , tổng lượng mưa là 237.4mm , nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			<p>quả phát triển giai đoạn này tuy nhiên tổng lượng mưa trong tuần lớn, người dân cần gia cố nền đất cho diện tích cây ăn quả, cắt bỏ cành sâu bệnh cũng như bọc lưới tránh bị rụng quả khi mưa lớn xảy ra đồng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương phun thuốc diệt trừ sâu bệnh phù hợp và hiệu quả, tránh lây lan ra diện tích rộng.</p>
Cây ngô	Thu đông	Trồng, 3-7 lá	<p>Nhiệt độ thích hợp cho ngô giai đoạn này là 25 - 28 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.1 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.6°C, tổng lượng mưa là 237.4mm, diện tích ngô thu đông đang ở giai đoạn cây con nên nhạy cảm với mưa lớn, trong tuần xuất hiện những trận mưa cường độ lớn kéo dài nên người dân cần chủ động tiêu thoát nước tránh ngập úng cho diện tích ngô mới trồng đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: sâu xám, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn.</p>
Cây nhãn		Phát triển quả - thu hoạch	<p>Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.1 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.6°C, tổng lượng mưa là 237.4mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần 2 tháng 8 tương đối lớn do đó người dân cần đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, khơi thông mương rãnh thoát nước đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bồ hóng, dơi; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như bao chùm trái bằng bao giấy, bao vải, bao nilon, bao lá dừa nước kết lại; nên thu hái trái tập trung dứt điểm cho từng cây, từng vườn trong ngày; có thể dùng tấm lưới nilon bao chùm hết cả cây nhãn hoặc trùm kín những khu vực có nhiều trái.</p>
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	<p>Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.1 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.6°C, tổng lượng mưa là 237.4mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 8 tương đối thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm trắng, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng</p>

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			một số biện pháp như: dùng cây che mát, tưới phun mưa trực tiếp vào búp chè khi bọ xít rộ.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.1 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.6°C, tổng lượng mưa là 237.4mm; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp, tổng lượng mưa trong tuần lớn cùng với nhiều trận mưa lớn xảy ra dễ gây ngập lụt cho diện tích ruộng rau đặc biệt là diện tích rau mới trồng, do đó người dân nên chủ động khơi thông mương rãnh thoát nước, tiêu nước kịp thời tránh úng ngập kéo dài.
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.1 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.6°C, tổng lượng mưa là 237.4mm, tuần vừa qua có tổng lượng mưa lớn, người dân nên chủ động tiêu thoát nước kịp thời đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn và theo liều lượng trên bao bì sản phẩm.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, người dân nên thăm ruộng đồng thường xuyên phát hiện sâu bệnh kịp thời và sử dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng