



Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 1 tháng 9 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 9 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 21.0 - 28.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.8°C, tổng lượng mưa là 189.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 25.7^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 29^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 22.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 37.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 58.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 32.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 153.8\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-13/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 14-15/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng đêm 15/9 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 16-17/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 18-21/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.4	22.8	25.6	152.1
Trong tuần	28.7	21.0	24.8	189.8
Tuần tới	32.0-34.0	22.0-25.0	27.0-29.5	100.0-180.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Làm đòng - trở bông - phoi màu - chắc xanh - đỏ đuôi	Trong tuần này, nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 24.8°C , lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 189.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực khá phù hợp với sinh trưởng của cây lúa (trừ một số diện tích lúa bị ảnh hưởng do gặp mưa to trong giai đoạn trở bông). Cây lúa trong khu vực Tây Bắc hiện đang trong các giai đoạn làm đòng - trở bông - phoi màu - chắc xanh - đỏ đuôi (đây là giai đoạn cây lúa miễn cảm với các đối tượng dịch hại như tập đoàn rầy, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn cổ bông...). Nếu không được phòng trừ kịp thời sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của cây lúa vụ Mùa 2022. Do đó, trong các

			giai đoạn này, cần chú ý theo dõi chặt chẽ biến biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa để kịp thời phòng trừ.
Cây ngô	Hè thu	Phát triển bắp – thu hoạch	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 21.0-28.7°C, tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Lượng mưa trong tuần của khu vực khá cao (mưa to xảy ra cục bộ trong một số ngày trong tuần) nên các khu vực trồng ngô trũng thấp cần lưu ý khả năng xảy ra ngập úng đối với cây ngô Thu đông hiện trong giai đoạn cây con. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu cuốn lá, sâu cắn nõn, châu chấu, sâu đục thân, sâu đục bắp...
	Thu đông	Cây con – phát triển thân lá	
Cây lạc	Hè thu 2022	Ra hoa - tạo củ	Tuần 1 tháng 9, nhiệt độ của khu vực đạt có xu thế giảm nhẹ so với tuần trước (với mức giảm nhiệt độ không khí trung bình 0.8°C), lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 189.8mm. Trong thời kỳ ra hoa, việc gặp mưa lớn gây ảnh hưởng không tốt tới khả năng thụ phấn của cây. Hơn nữa, mưa to khiến cho các khu vực trũng thấp khả năng xảy ra ngập cục bộ nên cần chú ý theo dõi để chủ động thoát bớt nước cho các diện tích này. Rầy xanh lá mạ, sâu cuốn lá, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lạc trong tuần cần chú ý.
Cây sắn		Phát triển thân lá – phát triển củ	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đối phù hợp cho cây sắn sinh trưởng và phát triển, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 189.8mm. Chú ý thoát nước cho cây sắn ở các khu vực trũng thấp. Trong tuần, bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn, ngoài ra còn có các đối tượng: bọ phấn trắng, rệp sáp...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả - mọng quả	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 21.0-28.7°C, khoảng nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Lượng mưa trong tuần này của khu vực khá cao (189.8mm). Trong giai đoạn này, cây ăn quả có múi cần nhiều nước, tuy nhiên lại không chịu được úng. Với lượng mưa trong tuần của khu vực như trên cần chú ý khả năng ngập úng ở các khu vực trũng thấp. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn

			quả có mủi trong tuần: ruồi đục quả, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo...
Cây nhãn		Thu hoạch	Cây nhãn trong khu vực Tây Bắc trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch quả. Thời tiết trong tuần này của khu vực có mưa khá to (mưa to xảy ra tập trung trong một số ngày), khi thu hoạch quả nhãn cần chú ý thu hoạch khi cành lá và quả đã khô ráo để bảo đảm cho chất lượng của quả nhãn sau thu hoạch. Trong tuần, cây nhãn chịu tác động bởi một số đối tượng: sâu đục thân, sâu đục cành, sâu đục cuống quả...
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Trong tuần này, nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 24.8°C, lượng mưa của khu vực đạt 189.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối phù hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển. Lưu ý tình trạng úng nước xảy ra ở các khu vực trũng thấp. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần: rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, sâu đục thân....

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 22.0- 34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0-29.5°C, tổng lượng mưa là 100.0-180.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tương đối cao. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm điều tiết nước hợp lý theo nhu cầu sinh trưởng của từng loại cây trồng; Có các biện pháp chăm sóc, bón phân, làm cỏ hợp lý cho từng loại cây trồng; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng