



Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 9 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 9 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 21.6 - 27.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.7°C, tổng lượng mưa là 103.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 86.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 33.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 18.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng Điện Biên, Lai Châu có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 25/9-01/10, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; ngày nắng; riêng từ đêm 27-28/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.7	21.0	24.8	189.8
Trong tuần	27.9	21.6	24.7	103.2
Tuần tới	31.0-34.0	24.0-27.0	27.5-30.5	60.0-110.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Làm đòng - trỗ bông - chín - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 21.6-27.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 103.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tương đối phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích lúa Mùa đã chín. Đối với các diện tích lúa còn lại, cần chú ý điều tiết nước hợp lý để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây lúa theo từng giai đoạn. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: sâu cuốn lá, rầy các loại, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại, khi phát hiện mức độ gây hại vượt quá mức cho phép cần nhanh chóng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun phòng trừ tránh cho các đối tượng phát sinh gây hại mạnh gây ảnh

			hưởng đến sinh trưởng của cây lúa.
Cây ngô	Hè thu	Phát triển bắp – thu hoạch	Trong tuần này, cây ngô trong khu vực Tây Bắc trong nhiều giai đoạn khác nhau, các diện tích ngô hè thu tiếp tục trong giai đoạn phát triển bắp – thu hoạch, các diện tích ngô thu đông tiếp tục trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực cơ bản khá phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Cây ngô hiện đang sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu cắn nõn, châu chấu...
	Thu đông	Cây con – phát triển thân lá	
Cây lạc	Hè thu	Làm củ	Trong tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 24.7°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 103.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối thích hợp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý các đối tượng: rầy xanh lá mạ, sâu cắn lá, bệnh đốm lá gây hại trên cây lạc. Trong trường hợp mức độ gây hại thấp, người dân có thể sử dụng các biện pháp thủ công để phòng trừ nhằm bảo vệ môi trường; trường hợp mức độ gây hại vượt quá mức cho phép, người dân cần nhanh chóng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để tiêu diệt các đối tượng gây hại.
Cây sắn		Phát triển thân lá – phát triển củ	Tuần 2 tháng 9, cây sắn trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực tương đối thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, cây sắn chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh khảm lá sắn do virus, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng... Trong quá trình chăm sóc, người dân cần tiếp tục thu gom và tiêu hủy các diện tích bị nhiễm bệnh để tránh cho bệnh lây lan trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây sắn cũng như ảnh hưởng đến chất lượng củ sắn khi thu hoạch.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả - quả xanh - quả chín	Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực Tây Bắc dao động trong khoảng 21.6-27.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 103.2mm. Với điều kiện thời tiết như trên, cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển tốt, tạo tiền đề cho năng suất và chất lượng quả khi thu hoạch tốt. Trong tuần này, cây ăn quả có múi tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng gây hại: nhóm

			nhện nhỏ, ruồi đục quả, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, bệnh loét...
Cây nhãn		Thu hoạch – ra lộc	Tuần 2 tháng 9, cây nhãn trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch, các diện tích đã thu hoạch xong hiện đang ra lộc. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, thời tiết trong tuần này của khu vực Tây Bắc tương đối thuận lợi cho cây nhãn thu hoạch nốt các diện tích quả đã chín cũng như thuận lợi cho việc ra lộc của cây nhãn. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần tập trung thu hoạch các diện tích nhãn đã chín quả, sau thu hoạch nhanh chóng tiến hành tía cành tạo lại tán cây để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng sâu bệnh hại cũng như bón phân chăm sóc để cây nhãn nhanh chóng phục hồi sau một vụ thu hoạch quả.
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trung bình trong tuần này của khu vực đạt 24.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 103.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực tương đối thuận lợi cho sinh trưởng của cây chè. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần: rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, sâu đục thân, bệnh phòng lá chè...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 24.0- 34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa là 60.0-110.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ đối cao, lượng mưa ở mức trung bình. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm điều tiết nước hợp lý theo nhu cầu sinh trưởng của từng loại cây trồng; Có các biện pháp chăm sóc, bón phân, làm cỏ hợp lý cho từng loại cây trồng; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang
KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng