



Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

Số: NNHV-12/DNBO/TTUD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ  
THỜI HẠN TUẦN  
(Từ ngày 17/3/2023 đến ngày 23/3/2023)**

**1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua**



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 10 - 16/3/2023)

Trong tuần từ ngày 10 - 16/3/2023, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực đạt 62,2%; tích ôn hữu hiệu tuần 122,1°C; bốc thoát hơi tiềm năng 21,2mm; lượng mưa hữu hiệu 0,0mm. Tuần qua, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng, không mưa, nhiệt độ không khí dao động từ 19,4 - 35,7°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 0,0 - 0,0 mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 10 - 16/3/2023)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	65,1	59,6	62,2
Tích ôn hữu hiệu (°C)	51,5	70,8	122,1
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,1	12,1	21,2
Mưa hữu hiệu (mm)	0,0	0,0	0,0


Tuần qua, khu vực Đông Nam Bộ ngày có nắng, không mưa đã ảnh

hưởng đến qua trình đậu quả của cây ăn quả, gây rụng quả non và thiếu nước; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng rệp, nhện, bệnh greening, bệnh vàng lá thối rữa, sâu đục quả...gây hại trên các vườn cây ăn quả có múi; sâu keo mùa thu, sâu khoang, sâu xám, bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt... phát sinh và gây hại trên ngô; sâu đầu đen bọ vòi voi, bọ cánh cứng tiếp tục phát sinh và gây hại trên cây dứa.


## 2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 17/3/2023 đến ngày 23/3/2023)




Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu



Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng



b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 55 - 60 °C, 04 ngày cuối dao động khoảng 77 - 84 °C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ trong khoảng từ 0,6 - 15%, riêng Bà Rịa - Vũng Tàu và một phần tiếp giáp với Bà Rịa - Vũng Tàu của tỉnh Đồng Nai có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức 3%.

Tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 1 - 7mm, 04 ngày cuối dao động xung quanh 3 - 7mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn cùng kỳ, dao động trong khoảng từ 16 - 100%; riêng tỉnh Bình Phước, phía Đông tỉnh Bình Dương và phần tiếp giáp với Bình Phước của tỉnh Đồng Nai có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, dao động khoảng 12 - 40%.

Độ ẩm không khí trong tuần dao động trong khoảng 74 - 81%. Lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động trong khoảng 22 - 23mm. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng khả năng vẫn chưa được đảm bảo (thiếu hụt khoảng 50 - 81% so với nhu cầu).

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	75,0 - 79,7	72,2 - 81,2	73,6 - 80,6
Tích ôn hữu hiệu (°C)	55,2 - 59,7	77,2 - 84,0	132,3 - 144,2
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,5 - 9,6	12,9 - 13,1	22,4 - 22,7
Mưa hữu hiệu (mm)	1,0 - 6,5	3,0 - 6,5	5 - 13,0
Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm)	- 80,7 ÷ - 50,2 %		

### **3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp**

Dự báo tuần tới, từ đêm 17 - 23/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ không khí trong khu vực dao động trong khoảng 24,3 - 35,4°C, tổng lượng mưa dao động trong khoảng 5,0 - 17,0 mm. (Nguồn: TT DB KTTV QG)


Lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, đòng – trỗ, chín, một số diện tích đã cho thu hoạch. Dự báo thời tiết khu vực có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào cục bộ, mức độ đáp ứng nước cho cây trồng khả năng vẫn chưa được đảm bảo (thiếu hụt khoảng 50 - 81% so với nhu cầu), do đó, người dân cần đảm bảo đủ nước cho lúa sinh trưởng và phát triển, đối với những ruộng lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đòng - trỗ cần duy trì nước ở mặt ruộng khoảng 1 - 3cm, đối với diện tích lúa cho thu hoạch, cần tranh thủ thu hoạch sáng sớm, tránh chiều tối có mưa rào. Thời tiết tuần tới cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, các loại rầy, sâu cuốn lá nhỏ... phát sinh gây hại trên lúa, người dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi, phát hiện sâu bệnh và kịp thời phòng trừ hiệu quả một số đối tượng sâu bệnh có dấu hiệu phát sinh gây hại trong tuần.

Cây cà phê đang trong giai đoạn ra hoa - đậu quả. Đây là giai đoạn cây cà phê cần đủ nước để cây ra hoa tập trung, thụ phấn tốt. Tuần tới mức độ đáp ứng nước cho cây trồng khả năng vẫn chưa được đảm bảo (thiếu hụt khoảng 50 - 81% so với nhu cầu), do đó, cần tưới đủ nước cho cây cà phê để cây ra hoa tập trung, hạn chế tối đa tình trạng không nở được hoa và xuất hiện hiện tượng hoa chanh dẫn đến khả năng không thể thụ phấn, thụ tinh, không đậu trái. Ngoài ra, cần lưu ý bón đầy đủ phân bón đa, trung và vi lượng cho cà phê để cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho cây nuôi quả, tăng khả năng chống chịu và hạn chế tình trạng rụng quả khi nhiệt độ không khí cao trong mùa khô.

**Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 17h00 ngày 24/3/2023**

**Tin phát lúc: 17h00**

**Người chịu trách nhiệm  
ban hành bản tin**



**Phạm Thị Kim Phụng**