



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 10 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 10 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 26.2 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.6°C, tổng lượng mưa là 115.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 145.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 24.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 84.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-25/10, phía Bắc đêm 21/10 có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 22-25/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 26-27/10 và ngày 30-31/10, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 28-29/10, phía Bắc có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31	25.6	28.3	260.4
Trong tuần	31.1	26.2	28.6	115.2
Tuần tới	27-30	21-24	24-27	150-250

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 2 tháng 10 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: vụ Hè Thu trà muộn đang trong giai đoạn chín – thu hoạch; Lúa Mùa trà chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ, trà muộn giai đoạn mạ - đẻ nhánh; lúa Thu Đông đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh; Lúa Vụ 3 (Bình Định) đang trong giai đoạn đòng trổ - thu hoạch. Trong giai đoạn mạ nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25 – 30°C. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 31.1°C, nhiệt độ trung bình 28.6°C và tổng lượng mưa là 115.2mm, cho thấy điều kiện thời tiết không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trên lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ ở Bình Thuận, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ; Sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ,... tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa vụ 3, lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24 – 27°C, tổng lượng mưa dao động từ 150 – 250mm. Đề phòng ốc bươu vàng tiếp tục gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai

đoạn từ Mạ - đẻ nhánh, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; chuột tiếp tục gây hại rải rác trên các trà lúa.

Cây ngô: vụ Hè Thu đang trong giai đoạn thu hoạch; vụ Mùa đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Giai đoạn cây con, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 25 – 28°C, tối thích trong khoảng 25 - 28°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 31.1°C, nhiệt độ trung bình 28.6°C và tổng lượng mưa là 115.2mm, cho thấy điều kiện thời tiết không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột,...hại cục bộ. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24 – 27°C, tổng lượng mưa dao động từ 150 – 250mm. Lưu ý triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, ngoài ra, sâu keo mùa thu đang phát triển, phát sinh gây hại.

Sắn: vụ Đông – Xuân đang trong giai đoạn nuôi củ - thu hoạch; vụ Hè Thu đang trong giai đoạn PTTL – tạo củ; vụ Mùa đang trong giai đoạn cây con. Đối với giai đoạn phát triển thân lá sắn cần nhiệt độ 20 - 27°C. Ở thời kỳ cây lớn, nhiệt độ thích hợp dao động từ 20-32°C. Thời kỳ phát triển củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 31.1°C, nhiệt độ trung bình 28.6°C và tổng lượng mưa là 115.2mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sinh vật tiếp tục gây hại như: nhện đỏ, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, rệp sáp... gây hại trên sắn giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ - thu hoạch. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24 – 27°C, tổng lượng mưa dao động từ 150 – 250mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại, ngoài ra, bệnh khảm lá virus tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại tăng ở những vùng nhiễm bệnh, nhất là những vùng mới xuống giống.

Rau màu: trong nhiều giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Các đối tượng sinh vật hại như xoăn lá virus, ruồi đục lá tiếp tục phát sinh gây hại trên rau họ cà; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sung rẫy, thối nhũn,; trên rau họ hoa thập thự chú ý các đối tượng sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sung rẫy, thối nhũn. Dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục hại đậu đỗ; sâu ăn lá hành, dòi đục hành, rệp, bệnh đốm lá,... tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ..

Mía: đang trong giai đoạn đẻ nhánh, vươn lóng, tích lũy đường. Thời kỳ cây con yêu cầu nhiệt độ cần lớn hơn 15°C. Thời kỳ mía làm lóng cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp nhất là từ 30 – 32°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 31.1°C, nhiệt độ trung bình 28.6°C và tổng lượng mưa là 115.2mm, cho thấy điều kiện thời tiết không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, rệp xơ trắng phát sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nguyên liệu mía. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24 – 27°C, tổng lượng mưa dao động từ 150 – 250mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh rệp xơ trắng, ngoài ra, bệnh chồi cỏ tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để, mía trồng mới không sạch bệnh.

Cây thanh long: đang trong giai đoạn chăm sóc, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 31.1°C, nhiệt độ trung bình 28.6°C và tổng lượng mưa là 115.2mm, cho thấy điều kiện thời tiết phù hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển; Ngoài ra, bệnh đốm nâu, thán thư, ... tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh do điều kiện thời tiết nắng nóng, ẩm độ cao, có mưa nhiều. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24 – 27°C, tổng lượng mưa dao động từ 150 – 250mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu, thán thư cho các vườn cây.

Cây sầu riêng: đang trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C, ẩm độ từ 75-80%, lượng mưa khoảng 56-83mm/tuần. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 31.1°C, nhiệt độ trung bình 28.6°C và tổng lượng mưa là 115.2mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24 – 27°C, tổng lượng mưa dao động từ 150 – 250mm. Bệnh xì mủ có khả năng tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.

Hồ tiêu: đang trong giai đoạn quả non, nuôi quả. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 26.2°C đến 31.1°C, nhiệt độ trung bình 28.6°C và tổng lượng mưa là 115.2mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển. Ngoài ra, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng hại rễ... phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên các vườn tiêu giai đoạn quả non – chắc quả, hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém. Đối với tuần tiếp theo nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24 – 27°C, tổng lượng mưa dao động từ 150 – 250mm. Triển khai các biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho vườn cây đang bị nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc lây lan của bệnh chết nhanh, gỉ sắt, tuyến trùng hại rễ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ dự báo tối cao dao động từ 27 – 30°C, tối thấp từ 21 – 24°C, trung bình từ 24 – 27°C, tổng lượng mưa dao động từ 150 – 250mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng